wurmtest.at
ZSE
AG.ZE zertifiziert
Kotlabor Schmid
0664 13 23 576
office@wurmtest.at

Wie entferne ich Magendasseleier aus dem Fell meines Pferdes?

Warum ist das wichtig? Magendasselfliegen kleben im Sommer und Frühherbst ihre kleinen, gelblichen Eier an die Haare deines Pferdes – vor allem an Vorderbeinen, Schultern, Unterkiefer und Lippen. Schlüpft die Larve, gelangt sie über das Maul in den Magen und bleiben dort bis zu 10 Monate lang an der Schleimhaut haften. Jedes Ei, dass du entfernst, ist eine Larve weniger im Magen.

Der Schlupf der Larven wird durch Wärme und Feuchtigkeit ausgelöst

– in der Natur vor allem durch das Belecken der Eier durch dein Pferd. Deshalb: Bitte dein Pferd nicht an den Beinen kratzen oder lecken lassen, wenn dort Eier sitzen.

So gehst du vor:

1. **Mechanisch entfernen (Hauptmethode):** Streiche mit einem Einmalrasierer, einem speziellen Dassel-Messer oder einer feinen Klinge entgegen der Wuchsrichtung über die Haare. Die Eier werden dabei vom Haar abgeschnitten. Alternativ funktioniert auch feines Schmirgelpapier.

2. **Mit warmem Wasser nachbehandeln:** Wasche die betroffenen Stellen zusätzlich mit wirklich warmem Wasser ab. Der Wärme- und Feuchtigkeitsreiz lässt übrig gebliebene, entwicklungsfähige Eier schlüpfen – die winzigen Larven werden dann einfach mit weggespült. Keine Sorge: Die Larven bohren sich nicht in die Beinhaut ein. Ihr Ziel ist die Maulhöhle – auf der Haut draußen sind sie chancenlos, solange du sie gründlich abspülst.

3. **Hygiene beachten:** Fange die entfernten Eier auf (z. B. mit einem Lappen darunter) und spüle den Bereich weg von Futtertrögen oder Weideflächen. Lass die Eier nicht einfach auf den Boden fallen.

Wichtige Einschränkungen:

Ganz frische Eier (erste 2–5 Tage) sind noch nicht schlupffähig – das warme Wasser erfasst nur die entwicklungsfähigen Eier. Deshalb das Abwaschen immer nur als Ergänzung, nicht als Ersatz zur mechanischen Entfernung sehen.

Einmalrasierer nach der Entsorgung nicht wiederverwenden.

Und danach? Da sich einzelne Eier trotzdem durchsetzen können, empfiehlt sich zusätzlich nach Ende der Flugsaison – 6-8 Wochen danach – eine Entwurmung mit einem Präparat gegen Magendasseln (z. B. Ivermectin). So werden auch Larven erfasst, die es bereits in den Magen geschafft haben.

Kurzfassung:

Rasierer oder Dassel-Messer gegen die Wuchsrichtung ⟶ mit warmem Wasser nachspülen ⟶ Eier sicher entsorgen ⟶ im Winter entwurmen.

Sichtung melden: office@wurmtest.at